



# ひやくまん穀通信

31年産キックオフ  
特別編



平成31年2月18日(月)、石川県地場産業振興センターにて「ひやくまん穀」生産者大会が開催されました。

30年産の栽培概況や販売状況報告、また31年度の生産・販売方針について説明がありました。



また、30年度の部門別コンテストも実施されました!

おめでとうございます!

## ● 千粒重部門

最優秀賞 福嶋 敏広様……29.3g

優秀賞 山崎 茂一様……28.7g

部会平均 26.8g

## ● 整粒歩合部門

最優秀賞 瀬戸 礼子様……76.4%

優秀賞 橋本 誠様……74.6%

部会平均 54.6%

## ● 収量部門

最優秀賞 山崎 茂一様……774.0kg/10a

優秀賞 東 勇夫様……737.5kg/10a

部会平均 558.7kg/10a



パナソニックと農業試験場からの  
基調講演もありました。



今年も部会全体で品質・収量を確保し、  
ひやくまん穀を盛り上げていきましょう!

各支部で  
栽培マニュアル作成中!!

完成次第皆様に  
配布する予定です!

ひやくまん穀ホームページリニューアル  
しました!! <https://www.is.zennoh.or.jp/>



Facebookで  
「ひやくまん穀」で検索!

随時更新  
いたします!



米新品種「ひやくまん穀」普及推進委員会



JA全農いしかわ米穀園芸部米穀課 TEL.076-240-5331  
石川県農林水産部生産流通課 TEL.076-225-1621

ひやくまん穀

検索

f t i 100.kome.ishikawa



今年もおいしさ百満足♪のひやくまん穀を届けましょう(^^)/

白山石川版

第1号

ひやくまん穀支援チーム  
白山石川営農推進協議会  
平成31年3月28日発行

# ひやくまん穀通信

## H30年産 反省点


- ①移植後の低温や植傷(深水管理等)による穂数不足・一穂粒数過剰
- ②登熟期の日照不足による登熟歩合の低下(特に遅い移植で)

対策 「土づくり」「5月上旬田植え」「初期分げつ確保」

## 1 土づくり ～ケイ酸を補給し、登熟能力UP↑↑～

○体の大きなひやくまん穀は、ケイ酸を多く必要としています。  
秋に土づくりを行っていない場合は、必ずケイ酸資材を投入しましょう。

| 肥料名       | 10a施用量(ケイ酸含有量) |
|-----------|----------------|
| 松任PKプラス   | 80kg (22kg)    |
| 松任ケイサンプラス | 80kg (24kg)    |
| 白山大地      | 80kg (16kg)    |
| PKけい酸09号  | 80kg (19kg)    |



○作土層を15cm以上確保する。

## 2 播種・育苗管理 ～穂数確保への道は、ここから始まります～

### (1) 播種作業は計画的に実施し、5月の連休中に稚苗を田植えしましょう！

《育苗日数の目安》

| 播種    | 田植え  | 育苗日数 |
|-------|------|------|
| 4月10日 | 5月1日 | 21   |
| 4月13日 | 5月3日 | 20   |
| 4月18日 | 5月6日 | 18   |

### (2) 種子準備・播種量

種子準備はコシヒカリと同様ですが、ひやくまん穀は大粒のため、播種量に注意してください。

播種量：

**乾粒145～150g/箱**

(コシヒカリ120gに比べ20%増量)

### (3) 初期病害虫防除

育苗箱施薬剤は、紋枯病に登録のある薬剤を使用しましょう。

| 使用時期     | 薬剤名             | 使用量       | 対象病害虫名                         |
|----------|-----------------|-----------|--------------------------------|
| 播種時～移植当日 | エバーゴルプラス<br>箱粒剤 | 50g<br>／箱 | いもち病、紋枯病<br>イネドロオウムシ、イネミズゾウムシ他 |

### (4) 育苗管理

育苗期間は一ヶ月以内とし、老化苗の植え付けとならないようにしましょう。

※老化苗や徒長苗を植え付けると、初期分げつ発生が遅れ、穂となる茎ができません。

#### 田植適期の苗

同じくらいの高さ

